



Avertissements[®]

agricoles Auvergne & Limousin

ISSN : 0763 - 7756

Grandes cultures

Le 24 Septembre 1986

n°15

C O L Z A	(. Grosse Altise : captures faibles surveiller les morsures
	(. Désherbage : levée des graminées

COLZA

Stade { levée (A)
 { 1 feuille (B1) à 2 feuilles (B2)

GROSSE ALTISE

★ Situation

Les captures en cuvettes ont débuté dans quelques situations à un niveau très faible.
Les morsures sont peu importantes.

★ Préconisations

Les parcelles n'ayant pas reçu de micro-granulés au semis doivent être surveillées très attentivement dès la levée.

Aucun traitement ne se justifie pour l'instant.

Intervenir seulement dès que 3 pieds sur 10 présentent des morsures.

▼ La fiche couleur jointe "Les Ravageurs du Colza" est à conserver.
ATTENTION : erreur de dose du KARATE au printemps - 0,15 l au lieu de 0,10 l

LIMACES

Surveiller attentivement vos parcelles avec le temps doux.

DESHERBAGE DE POST-LEVEE

★ Situation

Levées parfois massives de graminées (repousses...) dans de nombreuses parcelles.

★ Préconisations

En cas de salissement très important, un traitement avec un anti-graminées spécifique est conseillé dès maintenant.

Le tableau ci-contre fait le point sur l'ensemble des herbicides utilisables.

Matière active	Spécialité Commerciale	Dose/ha de spécialité	OBSERVATIONS
carbétamide	LEGURAME PM	3 kg	<ul style="list-style-type: none"> Depuis le stade 4 feuilles vraies du colza (B4) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation. Application possible sur sol gelé. Bonne action sur graminées. Insuffisante sur dicotylédones. <p>5 à 6 kg contre chiendent de novembre à fin janvier</p>
propyzamide	KERB 50 W	1,5 kg	<ul style="list-style-type: none"> A partir du stade 3 feuilles vraies du colza (B3) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation. Application possible sur sol gelé. Bonne action sur graminées. Insuffisante sur dicotylédones <p>2 kg contre avoine à chapelet 3 kg contre chiendent</p>
propyzamide + diuron	KERB ULTRA	1,2 kg	<ul style="list-style-type: none"> A partir du stade 4 feuilles vraies bien développées, 6ème feuille naissante des colzas sains bien implantés. De préférence avant l'hiver. Bonne action sur graminées Action limitante sur Sanves, Ravenelles.
carbétamide + diméfuron	PRADONE TS	3,5 kg - 4 kg	<ul style="list-style-type: none"> A partir du stade 6 feuilles vraies (B6) des colzas sains et bien implantés. Application possible sur sol gelé. Bonne action sur graminées (dont repousses de céréales) Une action sur dicotylédones : Efficace sur : Véroniques, Mourons, Céraistes, coquelicot Irrégulier sur : Matricaires, gaillets
alloxydime-sodium	FERVIN + Huile	1 kg + 3 l. huile	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza. De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec). Action essentiellement sur graminées (sauf Paturin) <p>1,0 à 1,25 kg + 3 l. huile contre graminées vivaces.</p>
fluazifop-butyl	FUSILADE + AGRAL	1,25 l. + 0,1 % vol. bouil.	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. Application de préférence sur végétation active. Action essentiellement sur graminées (sauf Paturin) <p>3,0 l. + Agral (0,1 %) contre graminées vivaces.</p>
sethoxydime	FERVINAL	2 l. + 3 l. huile	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec) Action essentiellement sur graminées (sauf Paturin) <p>3,0 l. + 3,0 l. huile Schéring contre graminées vivaces</p>
fluazifop-p-butyl	FUSILADE X 2 + AGRAL	0,7 l. + 0,1 % vol. bouil.	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza. De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec) Action essentiellement sur graminées (sauf Paturin) <p>1,5 l. + Agral (0,1 %) contre graminées vivaces.</p>
haloxyfop-éthyl	GALLANT	1,0 l.	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. Uniquement à l'automne Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec). Action essentiellement sur graminées <p>2,0 l. contre graminées vivaces et Paturin</p>
quizalofop-éthyl	TARGA + huile	1,25 l. + 2,0 l.	<ul style="list-style-type: none"> Quel que soit le stade du colza De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec) Action essentiellement sur graminées (sauf Paturin) <p>3,0 l. + 2,0 l. huile Schéring contre graminées vivaces.</p>